




# INFORMACIÓN

## DE EMERGENCIA




### **Freno despegado o flojo**

Si un freno se ha despegado o lo sientes flojo pero no es incomodo, lo puedes dejar así hasta tu próxima cita. Pero, si te causa molestia o dolor en la zona del freno flojo puedes utilizar una pinza de cejas para cortar el elástico alrededor del freno. Guarda el freno y lo traes a tu próxima cita. La causa más común para despegar un freno es comer alimentos demasiado duros o pegajosos, también morder bolígrafos, lápices o uñas.

### **Banda de metal despegado o flojo**

La causa más común para despegar una banda de metal es comer alimentos demasiado duros o pegajosos, también morder bolígrafos, lápices o uñas. Si una banda de metal se ha despegado o la sientes floja llama a la oficina, para programar una cita de reparación. Si la banda de metal esta sujeta a el alambre y esta causando dolor o irritación, corta el alambre al frenillo mas cerca. La banda de metal se va a deslizar del alambre. Trae la banda de metal a tu cita en caso que tenga que ser recementada o reemplazada.



### **Irritaciones causadas por un Alambre**



A veces la incomodidad causada por un alambre en sus frenillos puede ser resuelta moviendo el alambre lejos del área irritada con un algodón, goma de borrador, o cera. Si el alambre no se mueve, trate de cubrir la punta con un pedazo pequeño de algodón o una cantidad pequeña de cera. También pueden cortar el alambre con un cortaúñas o tijeras que hayan sido lavadas y esterilizadas en alcohol. Si usted no puede resolver la irritación que le está causando el alambre, llame a nuestra oficina para programar una cita.

### **Llagas en la boca**

El problema más común son las pequeñas llagas que salen por el rozamiento de los frenos. Como medida preventiva se debe de aplicar cera. La cera se debe de aplicar inmediatamente después de cepillarse los dientes y en una cantidad suficiente para cubrir las irregularidades. Esta aplicación es útil especialmente de noche y al principio del tratamiento. En algunos pacientes se recomienda colocar algodón húmedo entre las mejillas y los frenos durante las primeras noches para evitar un roce excesivo.





### **Se salio el Arco de Alambre del tubo**


Con un pinza de cejas tome el alambre y coloquelo dentro del tubo. También puede colocar cera encima del alambre para que no se este moviendo y cause irritación.

### **Separadores perdidos**

La mayoría de los pacientes pierde un separador durante su tratamiento. No se preocupe por perder un separador, pero llame a nuestra oficina para ver si necesita ser reemplazado.

### **Encías Inflamadas**

Si tus encías sangran al cepillarte y se ven inflamadas y/o rojas, es una indicación de inflamación gingival, esto se debe generalmente a que tu cepillado no es el adecuado ya sea en calidad y/o en cantidad. En este caso se recomienda que nos visites y nos comentes este problema para reforzar la técnica de cepillado.



### **Pérdida de ligadura elásticas**

Muchos pacientes pierden ligadura elásticas durante el tratamiento, pero no te preocupes, llama a la consulta para reemplazarlos. También puedes intentar colocar cera encima del freno para evitar que el alambre se este moviendo.

### **Incomodidad con el tratamiento ortodontico**

Durante la primera semana después que sus frenillos se hayan colocado y los ajustes rutinarios se hayan completado, probablemente usted sentirá un poco de dolor, sensibilidad o incomodidad. Usted puede tomar Tylenol o Motrin mientras se acostumbra a sus nuevos frenillos.

**Llame a nuestra oficina lo mas pronto posible si usted rompe o suelta cualquiera de sus aparatos. Por favor no venga directamente a la oficina-llamandonos, usted nos permitira programar una hora para poder verlo. Aun cuando usted tenga una cita regular fijada, llamenos inmediatamente para notificar si usted necesita que su aparato sea reparado.**



**JAMES R. WATERS, DDS, MSD**

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS

TREATMENT FOR CHILDREN, TEENS AND ADULTS